

POR ÚLTIMO, ESTATE ATENTA A:

Tras un aborto inducido pueden presentarse **SÍNTOMAS DE ADVERTENCIA DE UNA INFECCIÓN O ANEMIA SEVERA**. Debes buscar ayuda médica si observas:

- Sangrado abundante (coágulos) tipo hemorragia durante más de tres semanas.
- Fuertes cólicos, endurecimiento de la parte de baja del vientre o hinchazón permanente.
- Mal olor en la vagina.
- Fiebre.
- Náuseas, mareos, sensación de desmayo.
- Pulso rápido, más de 100 latidos por minuto

(Extraído de “Manual Introductorio a la Ginecología Natural”)

Para confirmar que ya no estás embarazada puedes hacerte un examen de sangre un mes después de realizado el procedimiento, ya que hay que esperar a que baje la Gonodotropina Corionica, que es la hormona del embarazo.

Si estás intranquila, y quieres asegurarte de que expulsaste todo, puedes realizarte una ecografía 3 o 4 semanas después de realizado el aborto. Al asistir al centro de salud **sólo describe los síntomas, sin dar más explicaciones, así estarás segura**. No tengas miedo, porque las pastillas no son detectables cuando se usan sublingüales. Recuerda siempre que **NADIE PUEDE OBLIGARTE A DAR MÁS INFORMACIÓN**.




Ilustración
Myrna Minkoff